

27. März 2024

# Verordnung Aktuell

## Schutzimpfungs-Richtlinie

### Impfung gegen Dengue

Der gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschließt, die im Epidemiologischen Bulletin Nummer 48 vom 30. November 2023 veröffentlichte „STIKO-Empfehlung zur Impfung gegen Dengue mit dem Impfstoff Qdenga“ (bei beruflicher Indikation und als Reiseimpfung) in die Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) zu übernehmen.

- Der tetravalente attenuierte Dengue-Lebendimpfstoff Qdenga ist ab dem Alter von 4 Jahren in Deutschland zugelassen.
- Die Grundimmunisierung besteht aus 2 Impfstoffdosen, die im Abstand von 3 Monaten s. c. verabreicht werden.

#### Berufliche Indikation

Personen, die anamnetisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben und außerhalb von Endemiegebieten gezielte Tätigkeiten mit Dengue-Viren ausüben (z.B. in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien) dürfen gemäß SI-RL gegen Dengue geimpft werden.

- Die Grundimmunisierung wird mit 2 Impfstoffdosen des tetravalenten attenuierten Lebendimpfstoffs Qdenga (Mindestabstand 3 Monate zwischen den Impfstoffdosen) durchgeführt.
- Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage über die Notwendigkeit bzw. den Zeitpunkt einer Auffrischimpfung getroffen werden, da entsprechende Studien noch nicht abgeschlossen sind.
- Für Personen, die in der Vergangenheit keine Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben („Dengue-Naive“), spricht die STIKO aufgrund der gegenwärtig limitierten Datenlage derzeit keine allgemeine Impfempfehlung aus.

## Reiseindikation

Personen  $\geq 4$  Jahre, die anamnetisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben und in ein Dengue-Endemiegebiet reisen sowie dort einem erhöhten Expositionsrisiko ausgesetzt sind (z.B. längerer Aufenthalt, aktuelles Ausbruchsgeschehen) dürfen gemäß SI-RL gegen Dengue geimpft werden.

- Bei Impfung aufgrund von Auslandsaufenthalten besteht ein Leistungsanspruch nur im Rahmen des § 11 Absatz 3 SI-RL.
- Die Grundimmunisierung wird mit 2 Impfstoffdosen des tetravalenten attenuierten Lebendimpfstoffs Qdenga (Mindestabstand 3 Monate zwischen den Impfstoffdosen) durchgeführt.
- Die vollständige Impfserie (2 Impfstoffdosen) sollte vor Abreise in ein Dengue-Endemiegebiet abgeschlossen sein.
- Informationen zu Dengue-Endemiegebieten stellt die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) auf ihren Internetseiten zur Verfügung.
- Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage über die Notwendigkeit bzw. den Zeitpunkt einer Auffrischimpfung getroffen werden, da entsprechende Studien noch nicht abgeschlossen sind.
- Für Personen, die in der Vergangenheit keine Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben („Dengue-Naive“), spricht die STIKO aufgrund der gegenwärtig limitierten Datenlage derzeit keine allgemeine Impfempfehlung aus.

Wir halten Sie up to date.

## Ihre KVB



Weitere Infos rund um Verordnungen:

→ [www.kvb.de/mitglieder/verordnungen](http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen)



KVB Servicecenter

**Kurze Frage – direkte Antwort**

**089 / 570 93 – 400 10**

Mo - Do 7:30 - 17:30 Uhr und Fr 7:30 - 16:00 Uhr

KVB Beratungszentrum

**Terminwunsch für ausführliche Beratung**

→ [www.kvb.de/mitglieder/beratung](http://www.kvb.de/mitglieder/beratung)

Mo - Do 8:00 - 16:00 Uhr und Fr: 8:00 - 13:00 Uhr