

12. Juni 2024

# Verordnung Aktuell

## Standardimpfungen

### Vervollständigung möglich!<sup>1</sup>

Unabhängig von den in der Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) genannten Altersgrenzen darf eine Standardimpfung bis zum vollendeten 18. Lebensjahr **nachgeholt** bzw. der Impfschutz **vervollständigt** werden (§ 11 Abs. 2 SI-RL).

#### Ausnahmen

##### ■ Haemophilus influenzae Typ b

- Grundimmunisierung im Alter von **2, 4** sowie **11 Monaten**; Frühgeborene erhalten zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von **3 Monaten**; insgesamt **4 Dosen**
- **Nachholimpfung** nur bis zum Alter von **4 Jahren** zulässig

Die Hib-Mono-Impfstoffe<sup>2</sup> (Act-HIB®) sind in Deutschland außer Vertrieb. Mehrfachimpfstoffe, die den Hib-Impfstoff enthalten, werden über den **Sprechstundenbedarf** (Muster 16a bay) bezogen. Um ggf. mit einem Mehrfachimpfstoff eine Vervollständigung der Impfung durchzuführen, achten Sie bitte auf die **Zulassung des Präparats**. Teilweise sind Mehrfachimpfstoffe nur für bestimmte Altersklassen, z. B. Säuglinge und Kleinkinder, zugelassen.

##### ■ Meningokokken B

- Grundimmunisierung im Alter von **2, 4** sowie **12 Monaten**
- **Nachholimpfung** nur bis zum Alter von **4 Jahren** zulässig

<sup>1</sup> [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Impfkalender/Impfkalender\\_node.html](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Impfkalender/Impfkalender_node.html)

<sup>2</sup> Über internationale Apotheken ist der Impfstoff Act Hib oder Hiberix als Einzelimport (genehmigungspflichtig!) bestellbar.

### ■ Pneumokokken

- Nur für Kinder bis zum **2. Lebensjahr** abrechenbar (Bayerische Impfvereinbarung); wurde die Impfung erst im 2. Lebensjahr begonnen, sind nur 2 Impfstoffdosen im Mindestabstand von 8 Wochen erforderlich; die Vervollständigung des Impfschutzes durch die 2. Impfdosis kann noch bis zum **27. Lebensmonat erfolgen**.
- **Nachholimpfung** nur bis zum Alter von **2 Jahren** zulässig

### ■ Rotavirus

- Grundimmunisierung im Alter von **2 und 3 Monaten** (sowie ggf. 4 Monaten) als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung; erste Impfung möglichst frühzeitig – bereits ab dem Alter von **6 Wochen** möglich; je nach verwendetem Impfstoff **2 bzw. 3 Dosen** erforderlich; Mindestabstand zwischen Impfdosen sollte 4 Wochen betragen; Impfserie je nach Impfstoff möglichst bis zum Alter von **16 bzw. 20 bis 22 Wochen abgeschlossen**, spätestens bis zum Alter von **24 bzw. 32 Wochen**
- **Nachholimpfung** nur bis zum Alter von **24 bzw. 32 Wochen** zulässig

### ■ Tetanus, Diphtherie und Polio

- Komplettierung der Impfung bei unvollständigem Impfstatus/-schutz auch noch im **Erwachsenenalter** möglich
- **Pertussis**: Einmalige Verabreichung für Erwachsene als Tdap-Impfung

Die Abrechnungsnummern finden Sie unter

- [www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen](http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen/impfungen)

Wir halten Sie up to date.

**Ihre KVB**



Weitere Infos rund um Verordnungen:

→ [www.kvb.de/mitglieder/verordnungen](http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen)



KVB Servicecenter

**Kurze Frage – direkte Antwort**

**089 / 570 93 – 400 10**

Mo - Do 7:30 - 17:30 Uhr und Fr 7:30 - 16:00 Uhr

KVB Beratungszentrum

**Terminwunsch für ausführliche Beratung**

→ [www.kvb.de/mitglieder/beratung](http://www.kvb.de/mitglieder/beratung)

Mo - Do 8:00 - 16:00 Uhr und Fr: 8:00 - 13:00 Uhr